

INFORMAVIMAS APIE SKIEPUS

ŠALUTINIS POVEIKIS

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad po skiepų galite pastebėti šias nepageidaujamas reakcijas į skiepą:

Labai dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti dažniau kaip 1 iš 10 žmonių):

- injekcijos (suleidimo) vietoje: skausmas, patinimas
- nuovargis
- galvos skausmas
- raumenų skausmas
- sąnarių skausmas
- šaltkrėtis, karščiavimas

Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 žmonių):

- injekcijos vietos paraudimas
- pykinimas

Nedažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 100 žmonių):

- padidėję limfmazgiai
- prasta savijauta
- galūnių skausmai
- nemiga
- injekcijos vietos niežėjimas

Retas šalutinis poveikis (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 1000 žmonių):

- laikinas vienos veido pusės paralyžius

Dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis):

- sunki alerginė reakcija

Paprastai tokių reakcijų atsiranda dar neišėjus iš gydytojo kabineto; visais atvejais nedelsiant kreipkitės į gydytoją/slaugytoją.

Pastabos. Pasakykite gydytojui/slaugytojui, jei Jūs vartojate ar neseniai vartojote kitą vakciną, ar jeigu turite alergiją (padidėjęs jautrumas) vakcinos veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, turėjote anafilaksinę reakciją į maistą/skiepus/vaistus. Gydytojas/slaugytoja Jums paaiškins numatomo atlikti skiepo tikslą, galimas nepageidaujamas reakcijas, pateiks susipažinimui vakcinos gamintojo informacinį lapelį, atsakys į visus Jums iškilusius klausimus. Pateikta informacija turi būti aiški.